

ANNEXES

REGLEMENT TYPE DE GESTION

- UNISYLVA -

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Annexe 1 : Possibilités d'utilisation des essences dans les régions forestières du Centre (extrait SRGS Centre)

ESSENCES RECOMMANDEES PAR GRAND TYPE DE MILIEUX EN REGION CENTRE

Essences feuillues et résineuses objectif	Essences	Possibilités d'utilisation
	Pin sylvestre	Recommandé dans les chênaies sessiliflores acides, il s'accommode des milieux les plus difficiles (sols sableux, engorgés, très pauvres, caillouteux, superficiels).
	Pin laricio de Corse	Recommandé dans toutes les régions naturelles, espèce assez plastique, peu exigeante sur la richesse minérale du sol. Ne pas l'introduire sur sol calcaire, argileux lourd dès la surface ou très engorgé.
	Pin maritime	Recommandé sur sols profonds assez acides (sols bruns acides limono-sableux, bien drainés, sols podzolisés), essence très frugale, craint les sols calcaires, sensible aux froids et aux gelées.
	Douglas	Recommandé sur des sols acides à riches avec une pluviométrie d'au moins 700 mm/an. Ne supporte pas les sols calcaires, superficiels ou les sols compacts.
	Chêne pédonculé	Recommandé sur des sols profonds, fertiles, bien alimentés en eau, essence subocéanique. Trouve son optimum de croissance sur les fonds de vallées riches et les plateaux argileux. Supporte les excès d'eau temporaire mais craint les fortes sécheresses estivales.
	Chêne rouvre ou sessile	Recommandé sur des sols moyennement acides sur matériaux limoneux ou argileux. Trouve son optimum de croissance sur les plateaux bien drainés. Supporte les sécheresses estivales, contrairement au chêne pédonculé.
	Hêtre	Recommandé sur sol bien drainé, accepte tout type de roche mère. Ne pas l'introduire dans les sols très pauvres chimiquement, à faible réserve en eau ou dans les milieux à pluviométrie inférieure à 700 mm., sur sols engorgés, sur sols argileux compacts.
	Robinier	Recommandé sur des matériaux très divers (sables, argiles, limons, calcaires) sols superficiels et secs. Essence très rustique. Colonise facilement les bords de rivière. Ne pas l'introduire sur des sols à engorgement temporaire marqué.
	Châtaignier	Recommandé sur les sols légers meubles filtrants, plutôt limoneux à limono-sableux, profonds et sans excès d'eau. Ne pas l'introduire dans les sols calcaires. Exige des précipitations > 700 mm bien réparties dans l'année.
	Frêne	Recommandé sur les fonds de vallées riches et frais, sur sols profonds équilibrés, bien aérés. Craint les gelées tardives. Ne pas l'introduire dans les sols acides, secs, marécageux, sur des argiles lourdes très compactes, sur sol calcaire superficiel.
	Aulne glutineux	Recommandé dans les milieux très humides, alcalins ou acides, sur des sols organo-minéraux engorgés de façon permanente. Les meilleures stations sont les aulnaies frênales alluviales.
	Noyer commun Noyer noir d'Amérique Noyer hybride	Recommandé sur les sols profonds aérés et riches, bien alimentés en eau (surtout pour le noyer noir d'Amérique). Le noyer commun tolère également le calcaire actif. Sensibilité marquée aux gelées printanières pour le noyer noir. Une pluviométrie > à 650 mm est nécessaire. Eviter d'utiliser le noyer commun en forêt (sensibilité à l'armillaire).
	Peuplier	Recommandé dans les stations à frêne et aulnaies frênales des plaines alluviales, sur des alluvions récentes riches et fraîches. Le choix du cultivar est à faire localement. Voir annexe 2 : cultivars éligibles aux aides de l'Etat en région Centre.
Essences feuillues essentiellement en mélange ou en accompagnement	Alisier torminal	Recommandé sur sols bruns sains moyennement acide, à texture légère, meuble argileux ou carbonaté.
	Cormier	Recommandé sur sols calcaires et sols acides, bien drainés, aérés et profonds, apprécie une certaine pierrosité. Tendance climatique subméditerranéenne.
	Erable sycomore	Recommandé sur sols profonds, frais bien structurés, neutres à basiques. Ne pas l'introduire dans les sols acides, secs ou avec de l'eau en excès. Nécessite un climat frais et une humidité atmosphérique élevée.
	Merisier	Recommandé sur les sols profonds aérés à dominante limoneuse. Déconseillé en peuplement pur. Ne pas le favoriser dans les zones à gelées tardives. Ne pas l'introduire dans les sols trop acides, compacts, avec du calcaire actif sur sols superficiels, avec un excès d'eau sur les premiers 40 cm)
	Charme	Recommandé sur sols à dominante limoneuse à argileuse assez sec à frais légèrement acides à neutres. Ne pas l'introduire dans les sols trop pauvres au niveau chimique, sur calcaire, ou sur sols engorgés.
	Bouleau verruqueux	Recommandé sur tout type de substrat, très tolérant vis-à-vis de l'alimentation en eau, optimum sur des limons sableux bien drainés et moyennement acides. Ne pas l'introduire dans les sols très acides ou argileux compacts.

Annexe 2 : liste des cultivars subventionnés par région

MAA/DGPE/SDFE/SDFCB/Bureau de la Gestion durable de la forêt et du bois

Période : JUILLET 2022 – JUIN 2024

CLONES DE PEUPLIER ELIGIBLES AUX AIDES DE L'ETAT POUR LA CULTURE EN FUTAIE Libre de droits = sans parenthèse, sinon Terme de la protection commerciale communautaire – Nom d'obteneur et/ou de son représentant	Sud-Est			Sud-Ouest		Nord-Ouest				Nord	Nord-Est		Remarques sanitaires**			
	Auvergne-Rhône-Alpes	PACA	Corse	Occitanie	Nouvelle-Aquitaine	Pays-de-la Loire	Bretagne	Normandie	Centre-Val-de-Loire	Île-de-France	Hauts-de-France	Grand-Est	Bourgogne-Franche-Comté	Installation du puceron lanigère observée en laboratoire	Installation du puceron lanigère observée en peupleraie mais sans impact négatif	Impact négatif du puceron lanigère sur la croissance en peupleraie
1. Peupliers euraméricains																
ALBELO (2039 – 3C2A)															Oui	
ALERAMO (2044 - CREA)																
BLANC DU POITOU															Oui	
BRENTA (2034 – CREA)																
DANO (2041 – 3C2A)																
DIVA (2044 – CREA)																
DORSKAMP	S	S					S	S		S		S	S	Oui	Oui	Oui
GARO (2041, 3C2A)																
KOSTER (2021 – 3C2A)*																
I-45/51																
LAMBRO (2034 – CREA)																
LUDO (2041 - 3C2A)																
MOLETO (2045 - CREA)																
MONCALVO (2045 – CREA)																
MUUR (2032- INBO)															Oui	
POLARGO (2037 – 3C2A)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	Oui	Oui	Oui
RONA (2041 – 3C2A)															Oui	
SOLIGO (2034 -CREA)														Soigner la plantation, reprise pouvant être délicate		
TARO (2034 – CREA)																
TUCANO (2044 – CREA)																
VESTEN (2032 – INBO)														Oui	Oui	Non
2. Peupliers interaméricains et rétrocroisement																
AF8																
RASPALJE																
3. Peupliers trichocarpa																
FRITZI-PAULEY																
TRICHOBEL																
4. Peupliers deltoides																
ALCINDE																
DELGAS (2043 – GIS Peuplier)																
DELLINOIS (2043 – GIS Peuplier)																
DELVIGNAC (2043 – GIS Peuplier)																
DVINA (2031 – CREA)																
OGLIO																
5. Hybrides Trichocarpa x maximowiczii																
BAKAN (2037 - INBO)														hybrides pouvant être sensible à Sphaerulina musiva (OQ non présent en Europe).		
SKADO (2037 – INBO)																
Nombre de clones utilisables	30	27	26	27	29	27	25	24	28	28	25	22	30			

	Cultivar subventionnable dans la région
S	Cultivar subventionnable placé "sous surveillance" , dont la culture est exposée à des risques sanitaires OU à des performances agronomiques en-deça des attentes initiales.

Liste "annexe" (clone expérimental subventionnable dans le cadre strict des dérogations et dont l'inscription en liste principale sera étudiée dans la suite de l'année)	aucun cultivar
--	----------------

* protection commerciale du cultivar KOSTER : protection communautaire jusqu'au 01/11/2021 (protection végétale communautaire n° EU1293), protection sur le territoire national jusqu'au 18/02/2024 (certificat d'obtention végétale COV).

** consulter la fiche conseil d'utilisation sur les peupliers cultivés concernant les sensibilités aux pathogènes et exigences stationnelles et compo